



要預防斑蚊入侵，就要清除室內室外不流動的積水

注意！預防、防護、通報斑蚊出



預防

室內

- 每星期至少更換一次花盆、花瓶、碟盤、寵物飲水容器中的水



- 門窗使用紗網

- 不要留存積水超過一星期

室外(每星期)

- 清除留存在廢棄輪胎、玩具、儲存容器和水桶中的積水



- 更換禽鳥飲水容器中的水

- 讓噴水池和游泳池中的水保持循環

- 清除在花盆底盤、樹洞、灑水器控制箱、水坑、屋簷排水槽中的積水

- 清除遺留在帆布、車庫中停放車輛及船隻內的積水



每月

- 檢查雨水儲存桶開口處和儲水桶上的過濾網



防護

- 在門窗、雨水儲存桶開口處，還有儲水桶上加裝或修復過濾網
- 在室外穿著長袖上衣、長褲，和鞋襪，尤其是在清晨天剛亮和黃昏天剛暗時
- 在皮膚或外衣上噴塗驅蚊劑，

如：敵避 (DEET)、皮卡瑞丁防蚊液、檸檬尤加利油、IR3535 (依照產品說明書使用)



通報


- 將日間蚊蟲叮咬狀況 (特別是在室內產生的)、蚊蟲孵育來源，和身上有白條紋的黑蚊出沒狀況，以致電或寄送電子郵件方式，通報到郡屬有害生物管制計劃單位

聯絡方式
 (858) 694-2888 • vector@sdcounty.ca.gov
www.sdvector.com

侵害性斑蚊相關資訊

- 室內室外均會出現
- 帶白色條紋的黑色蚊身
- 特別偏好叮咬人類；但也會叮咬動物
- 會在小型積水容器中孵卵，如：植物置放盆盤、花瓶、禽鳥飲水容器、景觀噴水池、放置在後院中的玩具、廢棄輪胎、甚或樹洞內。
- 蚊蟲卵可在缺水狀況下存活數月

生命週期



資料來源：大洛杉磯地區郡屬有害生物管控中心

- 蚊蟲卵在接觸到水後 1-2 天內即會孵化
- 蚊幼蟲食用海藻、小型水中微生物、水中植物和動物體。
- 蟲卵最快可在一星期內長成成蟲
- 成蟲最多可存活三星期
- 蟲卵和成蟲可在家中周圍找到
- 偏好溫和溫暖氣候 (如：聖地亞哥區域)

通報侵害性斑蚊 • (858) 694-2888

斑蚊

侵害性斑蚊並非原產於加州。斑蚊身體黑色帶白色條紋，會在日間侵犯叮咬人類，尤其是在室內。蚊蟲在家中及周圍孵化，可傳播登革熱、基孔肯亞熱病毒、黃熱病，和西尼羅病毒。

蚊蟲辨識方式

埃及斑蚊



身體和腿部有白色條紋
背部有藥匙吉他狀的白色曲線

白線斑蚊



身體和腿部有白色條紋
背部有一道銀白色線條劃過身體中間

照片 1 和 3 由疾病管制中心 James Gathany 提供
照片 2 和 4 由佛羅里達大學 · 佛羅里達昆蟲醫學實驗室提供

預防 · 防護 · 通報

現在只要在智慧手機上掃 QR 碼，就可以獲得我們在網路上的消息！



聖地亞哥郡
環境健康局
有害生物管制計劃
5570 Overland Avenue, Suite 102
San Diego, CA 92123
(858) 694-2888



預防



防護




通報



聖地亞哥郡
環境健康局
有害生物管制計劃



黃熱病病媒蚊



亞洲虎蚊