


要杜絕鼠患，就要清除所有會吸引老鼠的食物、水漬，和可隱匿處。



控制鼠患 5 步驟



找出老鼠可能進出處



找出老鼠的活動蹤跡

- 鼠糞
- 水果、紙板、木頭和塑膠容器上有洞或啃咬痕跡
- 牆面、籬笆，和進出口周圍有摩擦油污痕跡



移除老鼠棲息地

- 以 1/4 英吋 18-22 口徑的鐵絲網修繕開口處
- 以金屬門掃填補門下縫隙
- 提高木樁高度至距離地面 12 英吋
- 讓生長茂密的植物，如：九重葛和長春藤，遠離建築物和籬笆
- 每次用完後院的烤肉架後即刻清理
- 清除所有垃圾殘渣碎屑



清除吸引物

- 移除已成熟掉落在地上的果實、堅果，和蔬菜
- 將車庫垃圾桶和廚餘桶加蓋
- 儲存在車庫和工具房裡的食物，要放置在有加蓋的金屬容器內
- 每日清理未食用完畢的寵物飼料
- 清理前以稀釋漂白水噴灑在鼠糞周圍 (水：漂白水比例為 9 : 1)



誘捕老鼠

- 在有看到老鼠活動蹤跡之處擺放誘捕器
- 將夾式誘捕器固定住，以防被老鼠拖離
- 在開啟誘捕器前三天，先以食物誘餌吸引老鼠前來
- 避免在家中擺放毒餌，以免死在牆中的鼠屍產生腐敗氣味，並招引蒼蠅

歡迎來電洽詢「免費」鼠患宣導搜查！

技術人員在搜查鼠跡時，會：



- 尋找老鼠活動蹤跡和進出處
- 針對捕鼠和消滅鼠群棲息地部分給予指引
- 提供如圖所示的防治鼠患入門組合

歡迎來電洽詢免費鼠患宣導搜查 · (858) 694-2888

鼠群

名詞：有害生物，會汙染食物、傳播疾病、損毀建築，啃咬電線導致房屋火災

鼠種

屋頂鼠 / 黑鼠 (Rattus rattus)

- 在聖地亞哥郡最常見的鼠種
- 包含尾巴有 13-18 英吋長
- 愛好果實、堅果、蔬菜
- 棲息在地面上的樹叢、屋頂閣樓等地



挪威鼠 / 褐鼠 (Rattus norvegicus)

- 又名街鼠或溝鼠
- 包含尾巴有 16-20 英吋長
- 雜食性動物，植物及肉類皆食
- 喜居地面下或潮濕的環境



木鼠 (Neotoma spp.)

- 又名貨櫃鼠
- 包含尾巴有 12-18 英吋長
- 食蔬果
- 會築居在如屋頂或車輛引擎中的木條或碎片內



預防 • 排除 • 防護 • 誘捕

現在只要在智慧手機上掃 QR 碼，就可以獲得我們在網路上的消息！



聖地亞哥郡
環境健康局
有害生物管制計劃
5570 Overland Avenue, Suite 102
San Diego, CA 92123
(858) 694-2888



預防



防護



通報



聖地亞哥郡
環境健康局
有害生物管制計劃



鼠群

終結鼠種指南

