

تعليمات العزل المنزلي

لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)

التعليمات التالية مخصصة للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بكورونا أو المشتبه في إصابتهم إكلينيكياً بكورونا.

معلومات للأشخاص المصابين بكورونا الذين لم يدخلوا المستشفى

الرعاية المنزلية

يجب على الأشخاص المصابين بكورونا أو الذين ثبتت إصابتهم بكورونا ولكن ليس لديهم أعراض (بدون أعراض)، البقاء في المنزل وعزل أنفسهم عن الآخرين حتى يكملوا فترة عزلهم، ويصبح من الآمن تواجدهم بجوار الآخرين.

يمكن للأشخاص المصابين اتخاذ الخطوات التالية للمساعدة في تخفيف أعراضهم:

- أرح جسسك ودعه يتعافى.
- حافظ على رطوبة جسسك — اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء والسوائل التي تحتوي على الإلكتروليتات.
- طلب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين (أي، تايلينول®) حسب الحاجة لتقليل الحمى والألم* — لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أي دواء للبرد بدون وصفة طبية دون التحدث أولاً مع مقدم الرعاية الصحية.

توفر المقاطعة العلاج المجاني للأشخاص الذين جاءت نتائجهم مؤخراً لاختبار كوفيد-19 إيجابية أو لمنع الإصابة بكورونا بين الأشخاص الذي تعرضوا لاحتمالية الإصابة بكورونا.

فقد تتأهل للعلاج إذا:

- كانت نتيجة فحص كوفيد-19 الذي أجريته حديثاً إيجابية و
- بدأت الأعراض لديك في غضون آخر 5 أيام (بالنسبة للحربوب المضادة للفيروسات)، و
- أنت معرض بشدة لخطر المرض الشديد جراء كوفيد-19

- المركز الإقليمي للأجسام المضادة أحادية النسيلة (MARC) - اتصل على **619-685-2500** أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى COVIDTreatment@sdcounty.ca.gov لتحديد موعد الحصول على عقار باكسلوفید (Paxlovid).

يمكن علاج الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق في المركز الإقليمي للأجسام المضادة أحادية النسيلة (MARC) باستخدام الأقراص المضادة للفيروسات.* لعلاج طفل أقل من 12 عاماً، اتصل بطبيب الأطفال أو مقدم الخدمة المتتابع لطفلك. اطلع على [نشرة المرضى](#) لمعرفة المزيد حول العلاج المجاني. اتصل بالمركز الإقليمي للأجسام المضادة أحادية النسيلة عبر الرقم **619-685-2500** إذا أردت تحديد موعد إذا كنت تستوفي معايير الأهلية ولا يمكنك الوصول للعلاج من خلال طبيب. للاستعلامات، برجاء إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المركز الإقليمي للأجسام المضادة أحادية النسيلة عبر COVIDTreatment@sdcounty.ca.gov.

يُرجى عدم الذهاب إلى قسم الطوارئ لمجرد طلب العلاج المضاد للفيروسات أو عمل اختبار كوفيد-19. أقسام الطوارئ لدينا متأثرة بارتفاع حالات كوفيد-19 ويجب تخصيصها للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية طارئة.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمقاطعة سان دييغو الخاص بعلاج كوفيد-19، للحصول على مزيد من المعلومات.

*الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لا " تعالج" الفيروس أو تمنع انتشار الفيروس لآخرين ولكن يوصى بها لزيادة الراحة وتحفيظ بعض الأعراض المرتبطة بالمرض.

طلب الرعاية الطبية

راقب حالتك الصحية واطلب رعاية طبية فورية إذا ساءت الأعراض، خاصة إذا كنت في خطر متزايد للإصابة بمرض خطير. يتضمن ذلك **البالغين الأكبر عمرًا** (خطر التعرض للأمراض الشديدة يزداد بتقدم العمر) و **الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة معينة** (مثل السرطان، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض المسد الرئوي المزمن (COPD)، ونقص المناعة، والسمنة، وأمراض القلب، ومرض الخلايا المنجلية، ومرض السكري من النوع 2).

اتصل بالرقم 911 إذا كانت لديك أي أعراض تحتاج إلى مساعدة طارئة مثل:



أخبر العامل عبر الرقم 911 أنك مصاب بـ **كوفيد-19**. إذا أمكن، ارتدي قناعاً للوجه قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية.

إذا لم يكن الأمر عاجلاً، فاتصل بمقنن الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المشورة الطبية، فقد يتمكن من مساعدتك عبر الهاتف. إذا كنت بحاجة إلى زيارة مرافق رعاية صحية، فتأكد من ارتداء قناع الوجه قبل الدخول لحماية الآخرين من الإصابة بالعدوى منك.

قد يكون كوفيد-19 مرهقاً للناس، فراجع صفحة **كيفية إدارتك للصحة العقلية والتآقلم خلال كوفيد-19** للحصول على موارد للعائلات وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية لتعلم كيفية رعاية صحتك العقلية ودعم أحبابك أثناء نفسي المرض. قد تجد أنه من المقبول أيضاً معرفة أن خدمات الصحة العامة لن تُفضِّل عن أي معلومات شخصية عنك أو عن مقر عملك أو مدرستك أو تصرح بها ما لم يكن فعل ذلك ضروريًا لحماية صحتك أو صحة الآخرين.

حماية الآخرين

اتبع الخطوات أدناه للمساعدة في منع انتشار كوفيد-19 لأشخاص آخرين في منزلك ومجتمعك.

البقاء بالمنزل، إذا لزم الأمر، للحصول على رعاية طيبة.

- لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة.
- ابقي في المنزل وابعد عن الآخرين حتى تستوفي جميع الشروط الازمة لإنتهاء فترة العزل بأمان. (انظر المربع أدناه لمزيد من المعلومات حول إنتهاء العزل.)
- إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل أثناء مرضك، فلا تستخدم وسائل النقل العام. استخدم مرتبة شخصية، إن أمكن. إذا لم يمكنك القيادة بنفسك، فابق بعيداً أكبر مسافة ممكنة عن السائق، وقم بالقيادة مع فتح النوافذ وارتداء قناع أو غطاء للوجه.

- رتب لتوصيل الطعام وغيرها من الأساسيات إلى منزلك وتركها على باب منزلك إذا لم يكن لديك من يساعدك في الحصول على احتياجاتك الأساسية. اتصل بالرقم 1-1-2 للتعرف على الخدمات المتاحة. إذا كنت بحاجة لمقابلة شخص ما عند الباب، فارتدي غطاء للوجه.

إنهاء العزل المنزلي

قد ينهي الأفراد المصابون بكورونا-19، بغض النظر عن حالة اللقاح لديهم، أو العدوى السابقة، أو نقص الأعراض والذين يعانون بأنفسهم في المنزل العزل بمجرد استيفاء جميع الشروط التالية.

1. مرت 5 أيام على الأقل * منذ ظهور الأعراض لأول مرة (أو بعد تاريخ أول فحص إيجابي إذا لم تظهر أي أعراض).
 2. يمكن أن ينتهي العزل بعد اليوم الخامس إذا لم تكن الأعراض موجودة أو زالت وأجريت فحصاً آخر (سواء تفاعل البوليميراز المتسلسل أو المستضد) في اليوم الخامس أو في وقت لاحق وكانت نتائج الفحص سلبية.
 3. إذا كنت غير قادر على إجراء الفحص، أو اخترت عدم الفحص، أو كانت نتيجة الفحص إيجابية في اليوم الخامس (أو بعد ذلك)، فيمكن أن ينتهي العزل بعد اليوم العاشر إذا لم تكن قد أصبحت بالحمى لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام دواء لتخفيف الحمى.
 4. إذا كانت الحمى موجودة، يستمر العزل حتى 24 ساعة بعد زوال الحمى.
 5. إذا لم تتحسن الأعراض بخلاف الحمى، فيستمر العزل حتى تزول الأعراض أو بعد اليوم العاشر.
 6. وفقاً لإرشادات وضع الكمامات الصادرة عن إدارة كاليفورنيا للصحة العامة في ((CDPH))، يجب عليك ارتداء كماماً مجهزة جيداً عند التواجد حول الآخرين لمدة 10 أيام، خاصة في المواقف المغلقة.
- *الأشخاص الذين بدون أعراض الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل حاد يجب أن يفكروا في التشاور مع مقدم الرعاية الصحية أو خبر مكافحة العدوى وقد يُنصح بتمديد فترة عزلهم حتى 20 يوماً.

اعزل نفسك عن الآخرين داخل منزلك.

اختر غرفة معينة في منزلك تستخدماها لعزل نفسك عن الآخرين خلال تعافيك—ابق في هذه الغرفة بعيداً عن الآخرين في منزلك على قدر الإمكان. من المهم على وجه التحديد البقاء بعيداً عن الأفراد الآخرين الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير في حالة إصابتهم بالعدوى.

- استخدم دورة مياه منفصلة، إذا كان أمكن ذلك. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فقم بتنظيف الحمام وتعقيميه بعد كل استخدام كما هو موضح أدناه.
- تدريب على التباعد الاجتماعي عندما تكون حول الآخرين في منزلك—حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين.
- افتتح النوافذ أو استخدم مروحة أو مكيف هواء في المساحات المشتركة بالمنزل لضمان تدفق الهواء بشكل جيد.
- لا تسمح باستقبال الزوار في منزلك.
- لا تتعامل مع الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى أثناء مرضك.
- لا تُعد طعاماً أو تقدمه للأخرين.
- لا تعطي بالأطفال أو الآخرين في منزلك إن أمكن.

إذا لم يكن من الممكن عزل نفسك بشكل كاف عن الآخرين في منزلك، أو إذا كنت تعيش مع أفراد معرضين لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير إذا كانوا مصابين بكورونا-19 (مثل كبار السن أو المصابين بمرض مزمن أو يعانون من ضعف المناعة)، ففكر في البقاء في مكان آخر حيث يمكنك الانعزal عن الآخرين.

ارتد قناعاً للوجه إذا كنت ستلتقي بأخرين.

يجب عليك ارتداء قناع الوجه عندما تلتقي آخرين أو حيوانات أليفة، مثل عند مشاركة غرفة أو سيارة وقبل دخول المستشفى أو مكتب مقدم الرعاية الصحية. إنها لفكرة جيدة لهم أن يرتدوا الكمامات دائمًا من حولك أيضاً. إذا لم تكن قادرًا على ارتداء قناع للوجه (على سبيل المثال، لأنه يسبب صعوبة في التنفس)، فيجب لا يكون الأشخاص الذين يعيشون معك في نفس الغرفة معك. إذا لزم دخولهم غرفتك، فيجب أن يرتدوا قناعاً للوجه. بعد مغادرة غرفتك، يجب أن يغسلوا أيديهم على الفور، ثم ينزعوا قناع الوجه ويتخلصوا منه أو يضعوه مباشرة في الغسيل في حالة استخدام قناع وجه قابل لإعادة الاستخدام ويغسلوا أيديهم مرة أخرى.

- تغطية الفم عند السعال والعطس.**
لمنع انتشار العدوى لآخرين، عند السعال أو العطس قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بكمك. قم بالتخلاص من أي منديل في سلة قفامة مبطنة وأغسل يديك بالماء الصابون.

- تجنب مشاركة الأغراض المنزلية.**
لا تشارك الأطباق أو أكواب الشرب أو الكؤوس أو أواني الأكل أو المناشف أو مفارش الأسرة أو أي أشياء إضافية مع آخرين في المنزل. يجب غسل هذه الأغراض جيداً بعد الاستخدام بالصابون والماء الدافئ.

- حافظ على نظافة يديك.**
يجب على جميع الأشخاص في المنزل غسل أيديهم بشكل متكرر وجيد، خاصة بعد نفث أنوفهم أو السعال أو العطس؛ الذهاب إلى دورة المياه؛ وقبل تناول الطعام أو تحضيره. استخدم الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. استخدم معقم يدين يحتوي على 60% كحول على الأقل في حالة عدم توفر الماء والصابون وإذا كانت الأيدي غير متسخة بشكل واضح. تجنب لمس العين والأنف والفم بدون غسل الأيدي.

- قم بتنظيف جميع الأسطح "كثيرة اللمس" كل يوم.**
تشمل الأسطح كثيرة اللمس: العدادات، والطاولات، ومقابض الأبواب، وتركيبات الحمامات، والمراحيض، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والأجهزة اللوحية، وطاولات السرير. أيضًا، قم بتنظيف أي سطح قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل الجسم وأو إفرازات عليها. التعقيم باستخدام المنتجات المعتمدة من وكالة حماية البيئة التي ثبت استخدامها ضد فيروس كوفيد-19 (على سبيل المثال، منديل كلوركس المطهرة، منظف الأسطح المتعددة Lysol Clean & Fresh، منديل Purell Professional المطهرة للأسطح).

تعليمات التنظيف

- اتبع التوصيات الواردة على ملصقات المنتجات التنظيف بما في ذلك الاحتياطات التي يجب أن تتخذها عند استخدام المنتج، مثل ارتداء القفازات أو المراييل والتتأكد من أن لديك تهوية جيدة أثناء استخدام المنتج.
- استخدم محلول تبييض مخفف أو معقم منزلي ذات ملصق مكتوب عليه "معتمد من وكالة حماية البيئة". لمعرفة ما إذا كان المنتج يعمل ضد الفيروсов، اقرأ ملصق المنتج، أو اتصل بالرقم 1-800-1 الموجود على الملصق، أو قم بزيارة موقع www.epa.gov.

لصنع محلول تبييض بالمنزل:

مجموعة كبيرة	مجموعة بسيطة
3/1 كوب من المبيض	5 ملاعق شاي من المبيض
1-جالون (16 أكواب) ماء	1 كورات (4 أكواب) ماء

أضف 4 ملاعق صغيرة من المبيض إلى 1 كورات (4 أكواب) من الماء. للحصول على كمية أكبر، أضف 3/1 كوب من المبيض إلى 1 جالون (16 كوب) من الماء. [راجع دليل التطهير من فيروس كورونا كوفيد-19](#)
[الخاص بنا للحصول على مزيد من المعلومات.](#)

- اغسل الملابس جيداً.
- قم بإزالة الملابس أو مفارش الأسرة وغسلها التي قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل الجسم وأو إفرازات عليها.
- قم بارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة التعامل مع الأشياء الملوثة. اغسل يديك على الفور بعد إزالة القفازات — يمكن استخدام قفازات التنظيف المطاطية القابلة لإعادة الاستخدام كبديل في حالة عدم توفر القفازات التي تستخدم لمرة واحدة ويجب إزالتها بعد الاستخدام ووضعها مباشرة في الغسالة دون لمس أي شيء آخر ويجب غسل اليدين على الفور وبشكل كامل بعد لمس أي شيء قد يكون ملامساً لسوائل الجسم.
- اقرأ واتبع الإرشادات الموجودة على ملصقات المنظفات وأغراض الغسيل أو الملابس. بشكل عام، اغسل وجفف بأدفي درجات الحرارة الموصى بها على ملصق الملابس.
- ضع جميع القفازات والثياب وأقنعة الوجه والأشياء الأخرى الملوثة المعدة للاستخدام مرة واحدة في حاوية

مبطنة قبل وضعها مع النفايات المنزلية الأخرى. أغسل يديك على الفور بعد معالجة هذه العناصر. في حالة استخدام قفازات أو ثياب أو أقنعة للوجه أو أغطية للوجه قابلة لإعادة الاستخدام ، فضع هذه العناصر مباشرة في الغسيل بعد الاستخدام، وأغسل يديك جيداً.

• العودة للعمل أو المدرسة

عند الانتهاء من فترة العزل بالمنزل (وفقاً للربع أعلاه الخاص بإنتهاء العزل المنزلي)، لم تعد تعتبر معدياً ويمكن أن تستأنف أنشطتك المعتادة، بما في ذلك العودة إلى العمل أو المدرسة. لا تحتاج إلى تقديم أي دليل، مثل نتيجة اختبار سلبية أو خطاب من خدمات الصحة العامة، لتمكن من العودة إلى العمل أو المدرسة. يجب أن تستمر في اتباع كافة إرشادات السلامة عندما تلتقي بأخرين خارج أسرتك.

معلومات للمخالطين لك بشكل مباشر

ما المقصود بمخالط لك بشكل مباشر؟

"المخالط بشكل مباشر" هو أي شخص يشارك نفس المحيط الداخلي (على سبيل المثال، المنزل ، غرفة انتظار بالعيادة، الطائرة)، لمدة إجمالية تراكمية تبلغ 15 دقيقة أو أكثر خلال فترة 24 ساعة أثناء الفترة المُعدية. أنت تعتبر معدياً بداية من 48 ساعة/يومين قبل بدء ظهور الأعراض (بالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم أعراض، يكون هذا قبل 48 ساعة/يومين من إجراء الفحص) حتى انتهاء فترة العزل.

إذا كانت نتيجة فحص كوفيد-19 إيجابية، فيجب أن تخبر جميع المخالطين لك بشكل مباشر أنهم تعرضوا لكورونا كوفيد-19 ويجب عليهم اتباع الإرشادات الخاصة بالمخالطين المباشرين لمصابي كوفيد-19.

نمة استبعاد من أعمال محددة أو إرشادات حول العزل للمخالطين المباشرين بشكل مباشر الذين يعيشون أو يعملون في مواقع محددة عالية الخطورة. الواقع عالي الخطورة هي أماكن التي يكون فيها انتقال العدوى مرتفعاً، ويكون السكان الموجودين معرضين لخطر تبعات مرض كوفيد-19. الأكثر خطورة بما في ذلك دخول المستشفى والمرض الشديد والوفاة. تعد الواقع التالية هي موقع عالية الخطورة:

- ملاجئ الطوافئ ومرافق التبريد والتడفئة
- مواقع الرعاية الصحية
- ملاجئ المشردين
- المؤسسات الإصلاحية المحلية ومرافق الاحتياز
- موقع الرعاية طويلة الأمد ومراقب رعاية الكبار وكبار السن

إذا كان المخالطون لك بشكل مباشر يندرجون ضمن إحدى هذه الفئات أو إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول الاستبعاد من العمل والحجر الصحي في مقاطعة سان دييجو، فراجع [أمر الحجر الصادر عن مسؤول الصحة العامة لمزيد من المعلومات](#).

الابتعاد من العمل أو الحجر الصحي غير مطلوب للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. لا يحتاج الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة خلال الثلاثين يوماً السابقة إلى الخضوع للاختبار إذا كانوا من المخالطين عن قرب لكن لم تظهر عليهم أي أعراض. **المخالطون لك بشكل مباشر غير المندرجين في المجموعات المحددة أعلاه يلزمهم اتباع إرشادات الجمهور العام.**

راجع [إرشادات المخالطين بشكل مباشر لمصابي كوفيد-19](#) لمزيد من المعلومات. إذا ظهرت أعراض على المخالطين لك بشكل مباشر، فيجب عليهم عزل أنفسهم على الفور، واتباع تعليمات العزل المنزلي لكورونا كوفيد-19، وإجراء فحص كوفيد-19، واتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كانوا بحاجة إلى عناية طبية.

احتياطات للمخالطين بشكل مباشر

يوصى بأن يتتجنب الجميع مشاركة المحيط الداخلي ذاته أثناء وجودك في عزل منزلي.

يجب أن يرتدي مقدم الرعاية والمخالطين المباشرين بالمنزل قناع وجه وقفازات مُعدة للاستخدام مرة واحدة إذا قاموا بتنظيف غرفتك أو حمامك أو ملائمة سوائل جسمك وأو الإفرازات (مثل العرق واللعاب والبلغم ومخاط الأنف والقيء والبول أو الإسهال). يجب عليهم إزالة القفازات والتخلص منها أولاً وغسل أيديهم ثم إزالة أغطية الوجه والتخلص منها وغسل أيديهم مرة أخرى. (إذا تم استخدام قناع وجه وأو قفازات قبلة لإعادة الاستخدام، فضع هذه الأغراض مباشرة في الغسيل بعد الاستخدام واتبع نفس الخطوات في إزالتها).

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.coronavirus-sd.com للمزيد من المعلومات والموارد والتوجيه.
إذا كانت لديك مخاوف صحية، يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك. في حال عدم توفر مقدم رعاية صحية متابع لحالتك، أو عدم الانضمام إلى تأمين صحي، أو كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور على الموارد المجتمعية، فاتصل بالرقم 1-2-1 للحصول على المساعدة.