

Quý Vị Đi Du Lịch Nước Ngoài?



Hãy Bảo Vệ Khỏi Bệnh Sởi



Trước khi quý vị đi du lịch nước ngoài, hãy chắc chắn quý vị đã chích vắc-xin sởi-quai bị-rubella (MMR).

TRẺ SƠ SINH 6-11 THÁNG TUỔI



Chích một liều sớm vào khoảng 6-11 tháng tuổi. Theo lịch trình khuyến nghị và chích một liều nữa vào khoảng 12-15 tháng tuổi và liều cuối cùng vào khoảng 4-6 tuổi.

TRẺ EM 12 THÁNG HOẶC HƠN

không có dấu hiệu miễn dịch*



Chích liều đầu tiên ngay lập tức. Chích liều thứ hai 28 ngày sau liều đầu.

THIẾU NIÊN & NGƯỜI LỚN

không có dấu hiệu miễn dịch*



Chích liều đầu tiên ngay lập tức. Chích liều thứ hai 28 ngày sau liều đầu.

*Dấu hiệu miễn dịch bao gồm một trong những điều sau: Giấy chứng nhận chích vắc-xin tương đương, bằng chứng miễn nhiễm của phòng thí nghiệm, xác nhận của phòng thí nghiệm về bệnh sởi, sinh tại Mỹ trước năm 1957.

Lập kế hoạch chích vắc-xin kháng bệnh sởi đầy đủ trong ít nhất **2 TUẦN** trước khi đi. Nếu chuyến đi của quý vị chỉ còn chưa đến 2 tuần, quý vị vẫn nên chích một liều vắc-xin MMR.



LIVE WELL
SAN DIEGO

Để biết thêm thông tin, xin truy cập
sandiegocounty.gov/measles



21/03/2024