

فيما يلي أسئلة تجب مراجعتها
لمعرفة متى يتغير عليك إجراء
اختبار كوفيد-19.

متى يلزم إجراء اختبار كوفيد-19

قد تشمل أعراض كوفيد-19 ما يلي:

- الحمى
- فقدان التذوق والشم
- السعال
- آلام الجسم
- صعوبة في التنفس
- سيلان الأنف
- التعب
- التهاب الحلق
- الغثيان
- التقيؤ
- الإسهال


هل تظهر عليك
أعراض كوفيد-19؟



إذا كنت تعانى من أعراض كوفيد-19 ولم تظهر عليك أعراض بعد، فاتبع الإجراءات
الموصى بها أدناه:

- بادر بإجراء اختبار كوفيد-19 (إما اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبار المستضد) بعد 5 أيام من آخر تعرُض.
- ارتدِ غطاءً للوجه ذو مقاس مناسب لمدة 10 أيام بعد التعرُض، خاصةً في الأماكن الداخلية
وعندما تكون بالقرب من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد-19.
- راقب ظهور أي أعراض كوفيد-19 على صحتك حتى اليوم العاشر.


هل خالطت مريضاً
بفيروس كوفيد-19؟



احرص على إجراء الاختبار بانتظام إذا كنت في بيئة عالية المخاطر. قد تشمل البيئات
عالية المخاطر المرافق التالية:

- ملاجئ الطوارئ ومرافق التبريد والتدفئة
- بيوت الرعاية الصحية
- منشآت إيواء المشردين
- أماكن الرعاية طويلة الأجل ومؤسسات رعاية البالغين وكبار السن
- السجون والمعتقلات ومرافق التوقيف

في بيئة عالية المخاطر؟



إذا كان مستوى انتشار كوفيد-19 في مجتمعك متواصلاً أو مرتفعاً، ففكِّر في إجراء
الاختبار لمعرفة ما إذا كنت مصاباً بفيروس كوفيد-19.

ما هو مستوى انتشار كوفيد-
19 في مجتمعك؟

- تفضل بزيارة [صفحة انتشار كوفيد-19](#) حسب المقاطعة لمعرفة مستوى انتشار كوفيد-19 في مجتمعك.



لمزيد من المعلومات عن اختبار كوفيد-19، يرجى زيارة:

coronavirus-sd.com/testing