



**¿Ha salido positivo recientemente para COVID-19?
La terapia con anticuerpos monoclonales podría ayudarle
a reducir sus síntomas y prevenir la hospitalización.**

**La terapia temprana y profilaxis posterior a la exposición
(PEP, por sus siglas en inglés) para el COVID-19 está disponible**



**Para obtener más información o para programar un cita,
llame al (619) 685-2500.**



**Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a
COVIDtreatment@sdcountry.ca.gov.**



**Para más información, visite
www.sandiegocounty.gov/COVIDHealthProfessionals.**

- Disponible para personas **mayores de 12 años o más y al menos 88 libras**
- Disponible **sin costo**, independientemente del seguro médico o estado migratorio.

PRÓXIMAMENTE!

**MARC en
Vista Community
Clinic**
Vista

**MARC en
Escondido**
Escondido

**MARC en
Clairemont
Friendship Center**
Clairemont

**Family Health
Centers
of San Diego**
Hillcrest &
Chula Vista

Los anticuerpos monoclonales son proteínas hechas en un laboratorio que ayudan a fortalecer y estimular el sistema inmunológico con el fin de combatir los virus, incluyendo el virus que causa COVID-19

Tratamiento

Profilaxis-Posterior a la Exposición

*Disponible en MARC en
Clairemont Friendship Center*



Recientemente ha tenido una prueba positiva de COVID-19, Y

Tuvo síntomas de COVID-19 en los últimos 10 días, Y

Esta en la categoría de alto riesgo (vea abajo)

Prevención de COVID-19 en personas que han estado en contacto cercano con alguien infectado con COVID-19

Categorías de riesgo elegibles para el tratamiento

- Es mayor de 65 años de edad
- Está obeso(a) o tiene sobrepeso, con índice de masa corporal (IMC) de 25 o más
- Está embarazada
- Tiene diabetes, enfermedad renal crónica, o una condición que debilita el sistema inmunológico
- Tiene una enfermedad cardíaca, alta presión o una enfermedad pulmonar (como el asma)
- Tiene otras condiciones o factores médicos (por ejemplo, la raza o etnia) que pueden ponerlo(a) en un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19

Elegible para la profilaxis posterior a la exposición

- No está completamente vacunado(a)
 - no se espera que genere una respuesta inmune adecuada para completar la vacunación contra el SARS CoV-2 Y:
- Contacto cercano con una persona infectada con SARS-CoV-2, o
- En alto riesgo de exposición a una persona infectada con SARS-CoV-2 debido a una ocurrencia de la infección por SARS-CoV-2 en otras persona en el mismo entorno institucional (por ejemplo, asilos, prisiones).



LIVE WELL
SAN DIEGO