

# 用于检测现有感染的新冠病毒 (COVID-19) 检测选择

新冠病毒 (COVID-19) 检测能及早侦测到 SARS-CoV-2，即导致新冠病毒 (COVID-19) 的病毒。检测有助于识别与新冠病毒 (COVID-19) 确诊者有过密切接触的任何人，并有助于阻止病毒的传播。请查阅以下信息了解可用的检测选择。

	 分子检测	 抗原检测
也称为	逆转录聚合酶链式反应 (PCR) 检测。	快速检测（尽管某些 PCR 检测可作为“快速检测”进行）。
如何做检测？	将一根柔软的细棉签插入鼻子或收集唾液样本。	将一根柔软的细棉签插入鼻子或喉咙。
在哪里可以做检测？	化验室设施和即时医疗机构，例如，诊所、药房、医院、州和 <a href="#">县检测点</a> 。	化验室设施和即时医疗机构，例如，诊所和药房。可在药店或网上购买非处方家用自检试剂盒。
是否需要再次检测？	检测通常很准确，被认为是检测病毒的黄金标准，因此通常不需要做其他检测。	结果可能需要做分子检测确认。阳性结果通常准确，尤其是有新冠病毒 (COVID-19) 症状时。
需要多长时间才能知道检测结果？	一般在 1-3 天内就能知道结果。	一般在 15-30 分钟内就能知道结果。
检测费是多少？	您的医护人员可能会免费提供新冠病毒 (COVID-19) 检测。圣地亚哥县有 <a href="#">多个地点</a> 也提供免费聚合酶链式反应 (PCR) 检测。	每次检测费通常在 5 美元到 50 美元之间，但可能因地点而异。

## 如果出现以下情况，建议去做检测：

- 无论是否已接种疫苗或之前是否感染过病毒，出现了任何[新冠病毒 \(COVID-19\) 体征或症状](#)。
- 与新冠病毒 (COVID-19) 确诊者有过[密切接触](#)。



- 没有接种新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，在最近的活动或事件中无法安全地与他人保持距离，并担心有过接触。
- 医护人员或[州](#)、[部落](#)、[地方](#)、或[领地卫生部门](#)要求或转介去做[检测](#)。

有关新冠病毒 (COVID-19) 检测的更多信息，请访问：

**coronavirus-sd.com/testing**