

متى يلزم إجراء اختبار

كوفيد-19

هل تظهر عليك

أعراض كوفيد-19؟

قد تشمل أعراض كوفيد-19 ما يلي:

- الغثيان
- فقدان التذوق والشم
- الحمى
- التقئؤ
- السعال
- آلام الجسم
- صعوبة في التنفس
- الإسهال
- سيلان الأنف
- التعب
- التهاب الحلق



اختبار على الفور. إذا كانت نتيجة الاختبار الأول سلبية، فاختبره مرة أخرى بعد يوم أو يومين.

هل خالطت مريضاً

بفيروس كوفيد-19؟

إذا كنت تعرضت لفيروس كوفيد-19 ولم تظهر عليك أعراض بعد، فاتبع الإجراءات الموصى بها أدناه:

- ارتدِ غطاءً للوجه بحجم مناسب لمدة 10 أيام بعد التعرض، خاصة في الأماكن الداخلية وعندما تكون بالقرب من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد-19.
- راقب ظهور أي أعراض كوفيد-19 على صحتك حتى اليوم العاشر.



قم بإجراء اختبار كوفيد-19 (عبر مجموعة أدوات الاختبار الذاتي أو مقدم الرعاية الصحية) بعد 5 أيام من التعرض الأخير.

زيارة شخص في خطر؟

قد يشمل أولئك المعرضون لخطر الإصابة بمرض شديد:

- كبار السن
- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة
- الأشخاص الذين لم يطلعوا على آخر المستجدات بخصوص لقاءات كوفيد-19
- الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على التطعيم بعد



فكر في إجراء الاختبار قبل زيارتك.

مسافرًا؟

فكر في إجراء الاختبار إذا كنت:

- ظهور أعراض كوفيد-19 قبل أو أثناء أو بعد السفر.
- السفر لزيارة شخص أكثر عرضة للمرض الشديد بسبب كوفيد-19
- هم أكثر عرضة لخطر التعرض أثناء السفر، مثل التواجد في صالة مطار مزدحمة دون ارتداء كمامة.



لمزيد من المعلومات عن اختبار كوفيد-19، يرجى زيارة:

coronavirus-sd.com/testing