


何时接受COVID-19检测



是否出现COVID-19感染症状？



- 发烧
- 咳嗽
- 呼吸困难
- 乏力

COVID-19症状可能包括：

- 嗅觉或味觉丧失
- 全身疼痛
- 流鼻涕
- 喉咙肿痛
- 恶心
- 呕吐
- 腹泻

立即检测。如果首次检测阴性，您应该在1-2天后再次进行检测。

是否接触过COVID-19病毒？



- 应在接触病毒后10天内佩戴贴合面部的口罩，特别是在室内以及与重症COVID-19高危人群共处时。
- 监测10天的COVID-19感染症状。

最后一次接触病毒5天后接受COVID-19检测（居家检测试剂盒或者医疗保健人员的检测）。

访视存在感染风险的人员？



- 老年人
- 免疫功能低下人员
- 未更新接种COVID-19疫苗的人员
- 未能接种疫苗的儿童

存在重症感染风险的人员可能包括：

应考虑在访视之前进行检测。

外出旅行？



如果存在以下情况，应考虑进行检测：

- 旅行之前、期间或之后出现COVID-19感染症状。
- 外出旅行访视存在COVID-19重症感染高危风险人员。
- 旅行期间存在较高感染风险，例如在拥挤的机场航站楼内未戴口罩。

如需获得COVID-19检测的更多信息，请访问网站：
coronavirus-sd.com/testing