

Cuando Hacerse la Prueba de COVID-19

¿Tiene síntomas de COVID-19?



- Fiebre
- Tos
- Dificultad para respirar
- Fatiga

- Pérdida del gusto o el olfato
- Dolor corporal
- Secreción nasal
- Dolor de garganta

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea

Hágase la prueba de inmediato. Si su primera prueba es negativa, hágase otra prueba de 1 a 2 días después.

¿Ha estado expuesto al virus del COVID-19?



- Use una mascarilla que se ajuste bien a su rostro durante un total de 10 días después de la exposición, especialmente en habitaciones o lugares cerrados y cuando esté cerca de personas que tengan mayor riesgo de contraer COVID-19 gravemente.
- Monitoree su salud en busca de síntomas de COVID-19 hasta el día 10.

Hágase una prueba de COVID-19 (ya sea PCR o antígeno) 5 días después de la última exposición.

¿Visita a alguien que está en riesgo de enfermarse gravemente?



Las personas con riesgo de enfermarse gravemente pueden incluir:

- Adultos mayores
- Personas inmunocomprometidas
- Personas que no están al día con sus vacunas contra el COVID-19
- Niños que aún no pueden ser vacunados

Considerese hacerse una prueba antes de su visita.

¿Viajando?



Considerese hacerse una prueba si:

- Presenta síntomas de COVID-19 antes, durante o después del viaje.
- Viaja para visitar a alguien con un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.
- Se encuentra en mayor riesgo de exposición durante el viaje, como estar en una terminal de aeropuerto con mucha gente y sin utilizar mascarilla.



Para más información sobre pruebas para COVID-19, por favor visite:

coronavirus-sd.com/testing



10/31/2023