

لقاحات كوفيد-19 (COVID-19): الخرافات مقابل الحقائق

هناك العديد من الخرافات التي تدور حول لقاحات كوفيد-19. الحقائق أدناه هي بعض الخرافات الشائعة بدون أي ترتيب أو تفضيل معين.

الحقائق حول اللقاح

الخرافات حول اللقاح

حقيقة: لقاح كوفيد-19 لن يؤثر على الخصوبة.

يشجع لقاح كوفيد-19 جهاز المناعة في الجسم على محاربة الفيروس من خلال استهداف البروتينات الموجودة على سطح فيروس كورونا التاجي على وجه التحديد. هذا البروتين ليس هو نفس البروتين المرتبط بالحمل. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل خطير على الحمل والصحة العامة، وهذا يشمل المضاعفات التنفسية أو الحاجة إلى دعم التنفس الاصطناعي..

خرافة: الحصول على لقاح كوفيد-19 يمكن أن يؤثر على خصوبة النساء.



حقيقة: تم إعطاء ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19، وخطر الإصابة بالتهاب القلب منخفض جداً.

احتمالية الإصابة بالتهاب القلب (مثل التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب) بعد تلقي لقاح كوفيد-19 منخفضة (أقل من 0.0001%). يتم تشخيص ملايين الحالات من التهاب عضلة القلب كل عام ولا تكون مرتبطة بكوفيد-19. في الحالات النادرة التي حدثت فيها التهاب القلب بسبب لقاح كوفيد-19، تعافى حوالي 80% من المصابين وخرجوا من المستشفى.

خرافة: ساءت بالتهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب بسبب لقاح كوفيد-19.



حقيقة: منافع لقاح كوفيد-19 تفوق مخاطر عدوى كوفيد-19.

يساهم اللقاح في تعزيز الحماية بقوة ويقلل من شدة المرض الحاصلة بسبب مرض كوفيد-19. قد تؤدي المخاطر الإضافية الناجمة عن مرض كوفيد-19 دون التطعيم إلى أمراض أخرى مثل متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C)، أو الأعراض العصبية والخلل الإدراكي بين المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 لفترات طويلة*.

خرافة: لا يستحق الأمر عناء تلقي لقاح كوفيد-19 لأنك ما تزال معرضاً للإصابة بكوفيد-19.



حقيقة: لم يُفْت الأوان لتلقي اللقاح.

لم يُفْت الأوان. ينبغي أن تحصل على الحقنة الثانية لك في أقرب وقت ممكن من الفاصل الزمني الموصى به وهو 3 أسابيع أو 4 أسابيع. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعطاء جرعتك الثانية بعد جرعتك الأولى بفترة تصل إلى 6 أسابيع (42 يوماً). ومع ذلك، إذا تلقيت الحقنة الثانية لك من لقاح كوفيد-19 قبل أو بعد الموعد الموصى به فلن تضطر إلى إعادة بدء سلسلة اللقاح.

خرافة: لم يُفْت الأوان لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19.



حقيقة: لا تزال لقاحات كوفيد-19 فعالة ضد متحورات كوفيد-19، بما في ذلك المتحور دلتا.

تشير البيانات الحالية إلى أن لقاحات كوفيد-19 المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة توفر الحماية ضد معظم المتحورات التي تنتشر حالياً في الولايات المتحدة، بما في ذلك المتحور دلتا. لا تزال لقاحات كوفيد-19 توفر الحماية من مرض كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك الوفاة أو دخول المستشفى.

خرافة: لقاح كوفيد-19 لن يكن فعالاً ضد متحورات كوفيد-19.



*المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 لفترات طويلة هم أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مستمرة بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19.



30 يوليو 2021



للمزيد من المعلومات عن لقاحات كوفيد-19، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
coronavirus-sd.com/vaccine

لقاحات كوفيد-19 (COVID-19): الخرافات مقابل الحقائق

هناك العديد من الخرافات التي تدور حول لقاحات كوفيد-19. الحقائق أدناه هي بعض الخرافات الشائعة بدون أي ترتيب أو تفضيل معين.

الحقائق حول اللقاح

الخرافات حول اللقاح

حقيقة: الآثار الجانبية المحتملة بعد التطعيم بلقاح كوفيد-19 مؤقتة وتزول غالبًا بعد بضعة أيام.

الآثار الجانبية بعد تلقي اللقاح هي علامات طبيعية على قيام جسمك ببناء الحماية. ومن المفترض أن تزول هذه الآثار الجانبية في غضون أيام قليلة. على الرغم من أنك قد تشعر ببعض الألم أو الانزعاج الطفيف، غالبًا حول موضع التطعيم، فإن الحصول على لقاح كوفيد-19 يعد خيارًا أكثر أمانًا من كونك شخصًا كان مصابًا بكوفيد-19 وعانى من أعراضه لفترات طويلة*.

حقيقة: الخبراء واثقون من سلامة لقاح كوفيد-19 على المدى الطويل من خلال عقود من البحث والممارسة.

تمت دراسة تقنيات لقاح كوفيد-19 لسنوات واستخدامها في علاجات أخرى دون مشاكل. تمت دراسة لقاحات mRNA للإنفلونزا وداء الكلب، في حين أن لقاحات ناقل الفيروس الغدي (adenovector) كانت مفيدة منذ سبعينيات القرن العشرين لمحاربة الأمراض، مثل الإيبولا وزیکا. وحتى الآن، لا يزال لقاح كوفيد-19 خاضعًا للمراقبة للتأكد من سلامته.

حقيقة: توزع الولايات والمجتمعات المحلية لقاحات كوفيد-19 المرخصة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مجانًا.

يمكن لأي شخص يبلغ 12 عامًا من العمر فما فوق تلقي لقاح بدون تكلفة. لا تحتاج إلى حجز موعد، ولكن المواعيد متاحة إذا كنت تفضل ذلك. لا يمكنك شراء لقاحات كوفيد-19 عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى دفع أي تكاليف نثرية للحصول على لقاح كوفيد-19 المرخص - لا قبل موعدك ولا أثناءه ولا بعده.

حقيقة: ينبغي أن يحصل كل شخص قادر على الحصول على لقاح كوفيد-19 على التطعيم لحمايتك وحماية مجتمعك.

قد لا تتاح الفرصة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يعانون من حالات طبية مزمنة للحصول على التطعيم بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الوفاة بسبب كوفيد-19 لتلك الفئات أعلى بكثير. إن التطعيم ضد كوفيد-19 لا يساعدك أنت فحسب، بل يساعد الآخرين في مجتمعك.

حقيقة: يظل بإمكان الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 الاستفادة من تلقي اللقاح.

يُنصح الأشخاص بتلقي لقاح كوفيد-19 حتى لو كانوا قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 من قبل. إذا كنت مريضًا بكوفيد-19، ينبغي إعطاء اللقاح بعد 90 يومًا من الإصابة بالعدوى أو بعد تلقي العلاج بالأجسام المضادة. احتمالية تكرار الإصابة بالعدوى ممكنة، وسيكون تلقي اللقاح هي إحدى أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك.

خرافة: الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 خطيرة للغاية.



خرافة: تشكل الآثار على المدى الطويل غير المعروفة للقاح كوفيد-19 مخاطرة كبيرة.



خرافة: لا أملك المال لتسديد المال مقابل لقاح كوفيد-19.



خرافة: إذا تلقى الكثير من الأشخاص الآخرين اللقاح، فلن أحتاج إلى تلقيه.



خرافة: لقد أصبت بكوفيد-19 بالفعل، لذا أنا لا أحتاج إلى اللقاح.



*المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 لفترات طويلة هم أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مستمرة بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19.

للمزيد من المعلومات عن لقاحات كوفيد-19، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

coronavirus-sd.com/vaccine

