


JYNNEOS™ INTRADERMAL VS. O LABAN SA SUBCUTANEOUS NA BAKUNA

Ang JYNNEOS ay isang bakuna na pumipigil sa bulutong at monkeypox (MPOX). Ito ay ibinibigay sa dalawang dosis, alinman sa intradermally o subcutaneously. Kung ito ay hindi bababa sa 28 araw mula noong iyong unang dosis, mahalagang makuha ang iyong pangalawang dosis upang ganap na mabakunahan at maprotektahan.

INTRADERMAL (ID)

- Ibinibigay sa ilalim ng itaas na bahagi ng balat (epidermis) sa bisig, itaas na braso, o likod sa ibaba ng bahagi ng buto ng balikat.
- Maaaring magkaroon ng kapansin-pansing bukol sa balat, na kilala bilang "wheal."
- Ang mga side effect ng ID ay katulad ng SQ ngunit maaaring tumagal nang mas matagal. Maaaring magkaroon din ng pagkawalan ng kulay o pagkakapilat kung saan ibinigay ang bakuna.



SUBCUTANEOUS (SQ)

- Ibinigay sa ilalim ng balat (subcutaneous tissue) sa itaas ng braso. Ito ang mas karaniwang paraan ng pagbibigay ng bakuna.
- Karamihan sa mga taong nakakuha ng bakuna ay may maliliit na reaksyon (mga side effect). Maaaring kabilang dito ang:
 - Pananakit, pamumula, pamamaga, paninigas, o pangangati kung saan ibinigay ang bakuna.
 - Pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pagduduwal, panginginig, o pakiramdam ng pagkapagod.



Maaari mong piliin ang dosis ng iyong bakuna na ituturok sa alinman sa ID o SQ. Kung ang iyong unang dosis ay isang paraan, **MAAARI** mong piliin ang ibang paraan para sa iyong pangalawang dosis. Ang parehong mga pamamaraan ay nagbibigay ng parehong dami ng proteksyon laban sa MPOX.

