


إعطاء لقاح JYNNEOS™ بالحقن داخل الجلد في مقابل الحقن تحت الجلد

لقاح JYNNEOS هو لقاح مخصص للوقاية من الإصابة بمرض جدري القروذ (MPOX). ويُعطى على جرعتين، إما داخل الجلد أو تحت الجلد. إذا كان قد مر 28 يومًا على الأقل منذ تلقيك الجرعة الأولى، فمن المهم أن تحصل على جرعتك الثانية لضمان التحصين والحماية الكاملين.

داخل الجلد

- يُعطى اللقاح تحت طبقة الجلد السطحية (البشرة) في الساعد أو أعلى الذراع أو في الظهر أسفل لوح الكتف.
- يمكن أن تتسبب الحقنة في ظهور نتوء ملحوظ على الجلد يطلق عليه "بثرة".
- تتشابه الآثار الجانبية للحقن داخل الجلد مع الحقن تحت الجلد، لكن الآثار الجانبية في حالة الحقن داخل الجلد قد تستمر لفترة أطول. قد يكون هناك أيضًا تغيير في اللون أو تندب في مكان إعطاء الحقنة.



الحقن تحت الجلد

- تُعطى حقنة اللقاح تحت الجلد (أنسجة تحت الجلد) في العضد. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإعطاء اللقاح.
- يعاني معظم الأشخاص الذين يتلقون اللقاح من ردود فعل طفيفة (آثار جانبية). قد تشمل ردود الفعل هذه:
 - ألم أو احمرار أو تورم أو صلابة أو حكة في مكان الحقن.
 - آلام العضلات، أو صداع، أو غثيان، أو قشعريرة، أو الشعور بالتعب.



يمكنك اختيار إعطاء جرعة اللقاح إما داخل الجلد أو تحت الجلد. إذا كان يلزم إعطاء جرعتك الأولى بطريقة واحدة منهما، فيمكنك اختيار الطريقة الأخرى في الجرعة الثانية. توفر كلتا الطريقتين نفس القدر من الحماية ضد جدري القروذ.

