

지네오스(JYNNEOS™) 피내(ID) 주사 VS. 피하(SQ) 주사


지네오스(JYNNEOS)는 천연두와 원숭이두창(MPOX)을 예방하는 백신입니다.

이 백신은 피내 주사 또는 피하 주사를 통해 2회 접종됩니다.

첫 번째 예방주사를 맞은 후 최소한 28일이 지났다면, 두 번째 예방주사를 맞아 접종을 완료하여 바이러스로부터 보호받을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

피내(ID) 주사

- 아래팔, 위팔, 또는 어깨뼈 아래 등 부분 피부의 상층부(표피) 아래에 접종됩니다.
- 예방접종 부위는 “두드러기”처럼 보이는 부어오른 자국이 생길 수 있습니다.
- 피내 주사의 부작용은 피하 주사의 부작용과 유사하지만, 그보다 오래 지속될 수 있습니다. 또한, 주사를 맞은 부위의 피부색이 변하거나 흉터가 남을 수 있습니다.



피하(SQ) 주사

- 위팔의 피부 아래(피하조직)에 접종됩니다. 이것은 보다 일반적으로 예방주사가 접종되는 방식입니다.
- 예방접종을 받은 대부분 사람은 경미한 반응(부작용)을 경험합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:
 - 주사 맞은 부위의 통증, 피부 붉어짐, 봇기, 단단해짐, 또는 가려움.
 - 근육통, 두통, 메스꺼움, 오한, 또는 피곤함.



예방접종은 피내 주사 또는 피하 주사를 선택하여 맞으실 수 있습니다.

첫 번째 예방접종 시 특정한 한 가지 방식을 선택하셨더라도 두 번째는 다른 방식을 선택하실 수 있습니다.

두 가지 방식 모두 같은 수준의 MPOX 예방 효과를 제공합니다



최신 정보를 확인하시려면, 468-311로 COSD MPOX를 문자로 전송해 주십시오. 참고 자료:

SanDiegoCounty.gov/mpox