

JYNNEOS™ 皮内疫苗接种与皮下疫苗接种


JYNNEOS是一种预防天花和猴痘（MPOX）的疫苗。

该疫苗为两剂接种，可以通过皮内或皮下方式接种。

如果距首剂接种间隔已满28天，请务必接种第二剂，以获得完全接种和保护。

皮内接种 (ID)

- 在前臂、上臂或肩胛骨下方的表层皮肤（表皮）内给药。
- 皮肤上可能会出现明显凸起，被称为“风团”。
- ID接种的副作用与SQ相似，但持续时间可能较长。注射部位还可能出现皮肤颜色改变或斑痕。



皮下接种 (SQ)

- 在上臂皮肤下方（皮下组织）给药。这是接种疫苗的较常见方式。
- 大多数接种疫苗的人员仅有轻微反应（副作用）。这些反应可能包括：
 - 注射部位疼痛、发红、肿胀、硬结或刺痒。
 - 肌痛、头痛、恶心、发冷或疲劳。



您可以选择采用ID或SQ方式接种疫苗。

如果首剂选择一种接种方式，第二剂时您可以选择另一种接种方式。

两种接种方式对MPOX提供相同的保护力度。



如需信息更新，请发送短信 “COSD MPOX” 至468-311。

如需相关资源信息，请访问：

SanDiegoCounty.gov/mpox

