

원숭이두창

귀하와 다른 사람들을
보호하기 위해 징후를
인식하고 알아두십시오



원숭이두창:

- 귀하에게 질환을 일으킬 수 있는 바이러스성 질병입니다.
- 밀접하고, 피부 대 피부 접촉을 통해 더 자주 전파됩니다.
- 일반 대중에 대한 위험은 낮지만 현재 특정 인구 내에서 질병이 나타나고 있습니다.

질병 전파 방식



원숭이두창 발진, 딱지
또는 체액에 직접적인
접촉.



키스, 포옹 및
끌어안기.



전염성이 있는 발진, 딱지
또는 체액이 묻어있는
사물 및 섬유와의 접촉.

원숭이두창은 증상이 시작되는 시기부터
발진이 치유되고 모든 딱지가 떨어져 나간 후
새로운 피부층이 형성될 때까지 전파될 수
있습니다. 증상이 없는 사람은 다른 사람에게
바이러스를 전파시킬 수 없습니다.

징후 및 증상



발열



오한



림프절 부종



두통



근육통
또는 요통



발진 또는
상처

전염된 시기부터 증상이 나타나는 기간은
보통 7-14일 정도이나 5-21일까지입니다.
독감과 유사한 증상이 나타나는 경우,
발진은 보통 1-4일 후에 나타납니다.
질환은 보통 2-4주간 지속됩니다.



최신 업데이트를 알아보시려면, 문자로 **COSD**
MONKEYPOX를 468-311번으로 보내십시오. 더
많은 자료를 원하시면 다음을 방문하십시오:

SanDiegoCounty.gov/monkeypoxSD

