

Vắc-xin phòng virus đường hô hấp



Vắc-xin làm giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về loại vắc-xin nào phù hợp với bạn.

VẮC-XIN

AI

ĐỂ LÀM GÌ

KHI NÀO

COVID-19



- Mọi người, từ 6 tháng tuổi trở lên

- Vắc-xin cập nhật cho năm 2023-2024

- Sớm nhất có thể

Cúm



- Mọi người, từ 6 tháng tuổi trở lên

- Vắc-xin cập nhật cho năm 2023-2024

- Sớm nhất có thể
- Suốt mùa cúm

RSV



- Người lớn tuổi (60 tuổi trở lên)

- Một mũi

- Hiện đã có

RSV



- Người mang thai

- Một mũi tiêm để bảo vệ bé trong 6 tháng đầu đời

- 32-36 tuần thai kỳ

RSV Kháng thể Đơn dòng



- Trẻ sơ sinh < 8 tháng tuổi (nếu mẹ chưa tiêm vắc-xin trong thời kỳ mang thai) hoặc trẻ có nguy cơ cao 8-19 tháng tuổi

- Một mũi tiêm cung cấp kháng thể

- Hiện đã có
- Ở mùa RSV đầu tiên của trẻ sơ sinh

Không khuyến nghị phải chờ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 để được tiêm các loại vắc-xin khác.

Quý vị có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và các loại vắc-xin khác, bao gồm cả vắc-xin cúm, trong cùng một lần thăm khám.