了解COVID-19、流感和RSV（呼吸道合胞病毒）

流感

致病原因：流感病毒

传播方式：飞沫传播

染病症状：
接触病毒后1-4天开始

传染期：
症状出现前1天至出现染病症状后7天左右。

COVID-19

致病原因：
SARS-CoV-2病毒

传播方式：
飞沫传播以及封闭空间内的空气传播

染病症状：
接触病毒后1-4天开始

传染期：
症状出现前2天至出现染病症状后10天（最长20天）。**接触病毒5天后进行检测。**

并发症：
- 血栓
- 多系统炎症（儿童MIS-C和成年人MIS-A）

两者兼有

症状
- 全身疼痛
- 嗅觉或味觉丧失
- 呼吸困难

可能没有症状

并发症：肺炎等，*包括死亡。

所有三种

传播方式：
飞沫传播

症状：
- 呼吸困难
- 喉咙肿痛
- 流鼻涕
- 咳嗽
- 发烧
- 头痛
- 乏力

预防：接種疫苗

两者兼有

并发症：
可能导致其他疾病，例如肺炎。

症状：
打喷嚏

两者兼有

检测：
医疗保健人员可以进行RSV和COVID-19检测

RSV

传播方式：
飞沫传播

致病原因：
呼吸道合胞病毒

染病症状：
接触病毒后4-6天开始

传染期：
出现症状前1-2天
至出现染病症状后3-8天

并发症：
- 呼吸暂停
- 舌、口唇或皮肤呈现灰紫或青紫色
- 发热（3个月以下儿童）

预防：

如果患病，请待在家里

接種疫苗

咳嗽和打喷嚏时掩住口鼻

经常洗手，避免接触面部

经常对物体表面进行清洁和消毒

佩戴口罩

保持社交/身体距离

*并发症：肺炎、呼吸衰竭、心脏问题、器官衰竭、慢性病恶化；心脏、脑或肌肉组织发生炎性反应。

2023年8月11日