

ESE SARPUULLIDO O LESIÓN PODRÍA SER

SÍFILIS

La sífilis y otras ETS están en aumento en el Condado de San Diego

HAZTE LA PRUEBA. RECIBE TRATAMIENTO. CORRE LA VOZ.

Para hacerte la prueba de manera confidencial o recibir información:

www.STDSanDiego.org | STD.HHSA@sdcounty.ca.gov

SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS

- El primer síntoma es una lesión sin dolor que puede aparecer dentro o cerca de la boca, los genitales, o en la región anal.
- Un segundo síntoma puede ser un sarpullido o erupción que frecuentemente aparece en la palma de las manos, la planta de los pies, o en las axilas y en el área de la ingle.
- Los síntomas de sífilis pueden aparecer y desaparecer.
- Para curar la sífilis, se requieren pruebas médicas y tratamiento.

HAZTE LA PRUEBA AHORA

- Si tienes signos o síntomas.
- Si te estás haciendo pruebas para otras ETS.
- Si eres una persona sexualmente activa (se recomienda hacerse la prueba cada 6-12 meses).
- Si tienes relaciones sexuales sin condón (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses).
- Si tienes más de una pareja sexual (se recomienda hacerse la prueba cada 6 meses).
- Si eres hombre y tienes relaciones sexuales con otros hombres (se recomienda hacerse la prueba cada 3-6 meses).
- Si estás embarazada o tienes planes de embarazarte en el futuro.

ES LA SALUD DE ELLOS TAMBIÉN

SÍFILIS

y otras ETS pueden lastimar a tu bebé

HAZTE LA PRUEBA. RECIBE TRATAMIENTO. CORRE LA VOZ.

Para hacerte la prueba de manera confidencial o recibir información:

www.STDSanDiego.org | STD.HHSA@sdcounty.ca.gov

LA SÍFILIS EN LAS MUJERES

- La sífilis en las mujeres está aumentando en el Condado de San Diego.
- Si una mujer tiene sífilis mientras está embarazada, puede resultar en defectos de nacimiento (congénitos), aborto espontáneo, nacimiento prematuro, o muerte fetal (el bebé nace muerto).
- Buenas noticias: La sífilis se puede tratar y curar fácilmente con antibióticos, aun durante el embarazo.

SI ESTÁS EMBARAZADA

- La atención prenatal es muy importante para mantener saludables a ti y a tu bebé.
- Debes hacerte la prueba de sífilis tres veces durante tu embarazo 1) en la primera visita prenatal, 2) al inicio del tercer trimestre (alrededor de las 28 semanas) y 3) al momento del parto.
- Llama al 2-1-1 San Diego o visita www.STDSanDiego.org si no tienes médico de cabecera y necesitas saber dónde hacerte la prueba y recibir tratamiento.

Adaptado del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

