

Congenital Syphilis (Syphilis in Newborns)

1. What is congenital syphilis?

Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by bacteria. Syphilis is easy to cure. Without treatment, it can hurt your body's organs. Congenital syphilis is when a pregnant person passes syphilis to their baby during pregnancy or childbirth. Syphilis can cause a person to have their baby too early or cause a miscarriage or stillbirth (a baby born dead.) It can also lead to serious birth defects in babies.

2. How is syphilis spread?

You can get syphilis by having contact with a syphilis sore or bump during vaginal, anal, or oral sex. These sores or bumps can be found on the penis, vagina, anus, lips, or in the mouth. Depending on where they are located, you may not see them and, in many cases, they don't cause pain. Syphilis can also spread to a baby during pregnancy or delivery.

3. What are the symptoms of syphilis?

Many people don't notice any symptoms, so they don't know they're infected. Signs of syphilis may include a sore near the area where the bacteria entered the body (vagina, penis, anus, lips, or mouth) or rash on the palms of the hands, bottoms of the feet, or skin between the armpits and upper thighs. The only way to know for sure if you have syphilis is to get tested. A syphilis test is a routine part of prenatal care (medical care during pregnancy).

4. When should I get tested?

Prenatal care during pregnancy is very important to keep you and your baby healthy. You should be tested for syphilis three times during your pregnancy: 1) at your first prenatal visit, 2) early in the third trimester (around 28) and 3) at delivery.

5. How is syphilis treated?

Syphilis can be treated and cured with antibiotics, even during pregnancy. Syphilis treatment is safe for pregnant people to receive. Make sure your sex partner(s) get tested and treated too. This will help them stay healthy, avoid infecting others, and avoid re-infecting you. This is important, because having syphilis one time does not protect you from getting it again.

6. How can I prevent syphilis?

- Use condoms.
- Get prenatal care, including testing and treatment for syphilis, as early in pregnancy as possible. If you don't have a regular doctor, call 2-1-1 San Diego to find out where to get tested and treated or visit www.STDSanDiego.org.

Key Points:

- Congenital syphilis is when a pregnant person passes syphilis to their baby during pregnancy or delivery.
- Common symptoms of syphilis include a sore or rash, but many people don't notice any symptoms.
- Syphilis can be easily treated and cured with antibiotics, and syphilis treatment is safe for people who are pregnant.
- Prenatal care is very important to find and treat syphilis.

For more information:

www.STDSanDiego.org



* Additional languages are available.

Sífilis congénita (sífilis en los recién nacidos)

1. ¿Qué es la sífilis congénita?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria. La sífilis se cura fácilmente, sin embargo, sin tratamiento, puede dañar tus órganos. La sífilis congénita es cuando una persona embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. La sífilis puede ocasionar que una persona tenga a su bebé demasiado pronto o causar un aborto espontáneo o muerte fetal (el bebé nace muerto). También puede resultar en serios defectos de nacimiento (congénitos) en los bebés.

2. ¿Cómo se contagia la sífilis?

Te puede dar sífilis al tener contacto con una lesión de sífilis durante el sexo vaginal, anal u oral. Estas lesiones se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, los labios o en la boca. Dependiendo de dónde se encuentra la lesión quizás no las veas, y en muchos casos, no causan dolor. La sífilis también puede propagarse al bebé durante el embarazo o el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

Muchas personas no notan ningún síntoma, así que no saben que están infectadas. Los signos de la sífilis pueden incluir una lesión cerca del área por donde la bacteria entró al cuerpo (vagina, pene, ano, labios, o boca) o un sarpullido en la palma de las manos, planta de los pies, axilas, o área de la ingle. La única manera de saber con seguridad si tienes sífilis es hacerte la prueba. La prueba de sífilis es una parte rutinaria de la atención prenatal (atención médica durante el embarazo).

4. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?

La atención prenatal durante el embarazo es muy importante para mantenerte saludables a ti y a tu bebé. Debes hacerte la prueba de sífilis 3 veces durante tu embarazo: 1) en tu primera visita prenatal, 2) al principio del tercer trimestre (alrededor de las 28 semanas) y 3) al momento del parto.

5. ¿Cómo se trata la sífilis?

La sífilis se puede tratar y curarse con antibióticos, aun durante el embarazo. El tratamiento de la sífilis es seguro para personas embarazadas. Asegúrate de que tu pareja(s) sexual(es) también se haga(n) la prueba y reciba(n) tratamiento. Esto les ayudará a mantenerse saludables, evitar contagiar a otras personas, y evitar contagiarte otra vez. Esto es importante, porque tener sífilis una vez no te protege de contraerla nuevamente.

6. ¿Cómo puedo prevenir la sífilis?

- Usa condones.
- Recibe atención prenatal, incluyendo pruebas y tratamiento para la sífilis, lo más cerca posible del inicio del embarazo. Si no tienes médico de cabecera, llama al 2-1-1 San Diego para saber dónde hacerte la prueba y recibir tratamiento o visita www.STDSanDiego.org.

Puntos Clave:

- La sífilis congénita es cuando una persona embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto.
- Síntomas comunes de la sífilis incluyen una lesión o sarpullido, pero muchas personas no notan ningún síntoma.
- La sífilis se puede tratar y curar fácilmente con antibióticos, y el tratamiento de la sífilis es seguro para personas embarazadas.
- La atención prenatal es muy importante para detectar y tratar la sífilis.

Para mayor información:

www.STDSanDiego.org



Hay idiomas adicionales disponibles