




ኢንፍሉዌንሻ / Flu



መንስኤው:
ኢንፍሉዌንሻ ቫይረስ

የመተላለፊያ መንገድ:
በመተንፈሻ አካላት የፈሳሽ ብናኞች



ህመም: ከተጋለጡ ከ1-4 ቀናት በኋላ ይጀምራል

የሚተላለፈው:
ምልክቶቹ ከመጀመራቸው 1 ቀን በፊት እና ህመሙ ከጀመረ 7 ቀናት ገደማ በኋላ



መከላከያ መንገድ:
ክትባት/Flu Shot

ሁለቱም

የመተላለፊያ መንገድ:
በበሽታው ከተያዘ ሰው በሚወጡ የመተንፈሻ አካላት የፈሳሽ ብናኞች

ምልክቶች:

- ትኩሳት
- ሳል
- ለመተንፈስ መቸገር
- ድካም
- የሰውነት ህመም
- የአፍንጫ ፈሳሽ
- ራስ ምታት
- የጉሮሮ መቁሰል


ምንም ምልክት የማይታዩት አጋጣሚም ሊኖር ይችላል

የሚያስከትላቸው ችግሮች:

የሳንባ ምች እና ሌሎችም *፣ ሞትን ጨምሮ

መከላከያ መንገድ:

COVID-19



መንስኤው:
SARS-CoV-2 ቫይረስ

የመተላለፊያ መንገድ:
በመተንፈሻ አካላት የፈሳሽ ብናኞች እና አየር በታፈነበት ቦታ



ህመም: ከተጋለጡ ከ2-14 ቀናት በኋላ ይጀምራል

ምልክቶች:

- የመቅመስ ወይም የማሽተት ስሜት ማጣት

የሚተላለፈው:

ምልክቶቹ ከመጀመራቸው 2 ቀናት በፊት እና ምልክቶቹ ከታዩ ከ 10 ቀናት በኋላ (እስከ 20 ቀናት) ::

የሚያስከትላቸው ችግሮች:

- የደም መርጋት
- መልቲሲስተም ኢንፍላማቶሪ ሲንድሮም በሽታ በልጆች (MIS-C) እና አዋቂዎች (MIS-A)



*የሚያስከትላቸው ችግሮች: የሳንባ ምች ፣ የመተንፈሻ አካላት ችግር ፣ የልብ ችግሮች ፣ የአካል ችግሮች ፣ ሥር የሰደዱ የሕክምና ሁኔታዎች መጣጣስ ፣ የልብ ፣ የአንጎል ወይም የጡንቻ ሕዋስ እብጠት ናቸው ::