




독감



감염 원인:
인플루엔자바이러스

전파 경로: 호흡기 방울



질병: 노출 후 1-4일 후 발병

전염성: 증상 발현 하루 전부터 시작하여 질병 발발 후 7일 간



예방책: 독감 예방 주사

둘 다

전파 경로:

감염자의 호흡기 방울

증상:

- 발열
- 기침
- 호흡 곤란
- 피로감
- 몸살
- 콧물
- 두통
- 인후염

무증상으로 발현 가능

합병증:

사망을 포함하여 여러 증상* 중 특히 폐렴

예방책:

코로나 19 (COVID-19)

감염 원인: 사스 코로나 바이러스 2(SARS-CoV-2)



전파 경로: 호흡기 방울 그리고 밀폐된 공간 내의 공기

질병: 노출 후 2-14일 후 발병



증상:

- 미각 및 후각 상실

전염성: 증상 발현 이틀 전부터 시작하여 증상 발현 후 10일간 (최장 20일까지).

합병증:

- 혈전
- 소아(MIS-C) 및 성인(MIS-A)의 다기관 염증 증후군



몸이 아플 때 외출 삼가기



기침이나 재채기할 때 가리고 하기



얼굴 만지지 않기



손 씻기



자주 만지는 접촉면 청소 및 소독하기



안면 가리개 착용하기



사회적/물리적 안전 거리 유지 실천하기

*합병증: 폐렴, 호흡부전, 심장질환, 장기부전, 만성 질환의 악화, 심장, 뇌 또는 근육 조직의 염증