

호흡기세포융합바이러스 (RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS, RSV)

RSV가 무엇입니까?

RSV는 주로 경미하고 감기와 유사한 증상을 일으키지만 특히 영아 및 노인에게 심각한 질환을 일으킬 수도 있는 흔한 호흡기 바이러스입니다.

증상은 무엇입니까?


RSV 감염자는 일반적으로 증상이 시작되기 1~2일 전부터 전염성이 있으며, 감염 후 4~6일 이내에 증상이 나타납니다. 일부 영아와 면역 체계가 약한 사람들은 증상이 사라진 후에도 바이러스를 계속 전파할 수 있습니다(4주까지). 증상에는 다음이 포함됩니다.

- 콧물
- 식욕 감소
- 기침
- 재채기
- 열
- 쌉쌉거림

어떻게 전파됩니까?

RSV는 환자와의 다음 밀접 접촉을 통해 전파될 수 있습니다.

- 재채기 또는 기침
- 감염된 표면을 만지고 손을 씻지 않은 채로 얼굴을 만짐



어떻게 RSV를 예방할 수 있습니까?



50세 이상의 성인은 RSV 백신을 접종할 수 있습니다.



임부는 출생 후 아기를 보호할 수 있는 RSV 백신을 접종할 수 있습니다.



생후 8개월 미만의 영아와 생후 8~19개월의 고위험 영아에게는 단클론 항체를 투여할 수 있습니다.

기타 예방 팁:



아플 때는 집에 머무르십시오.



아플 때는 마스크를 착용하십시오.



재채기 또는 기침을 할 때 가리십시오.



정기적으로 손을 씻으십시오.