

## El cuidado del brazo después de la prueba de tuberculina en la piel.

P: ¿Qué puedo hacer con mi brazo?

R: Todo que haría normalmente.

P: ¿Cómo me limpio el brazo?

R: Puede bañarse como lo hace normalmente.



P: ¿Qué hago si me da comezón o aparecen ampollas en el brazo?

R: Ponga un cubito de hielo en una toallita o en un pañuelo y póngaselo en el brazo. ¡NO SE RASQUE!

P: ¿Puedo usar un “curita” si hay sangrado?

A: NO. Los “curitas” aumentan las alergias. Use un trocito de algodón seco para limpiar la sangre.



**Deberá regresar a esta clínica en un plazo de 48 a 72 horas para la lectura de la prueba o será necesario repetirla.**

## El cuidado del brazo después de la prueba de tuberculina en la piel.

P: ¿Qué puedo hacer con mi brazo?

R: Todo que haría normalmente.

P: ¿Cómo me limpio el brazo?

R: Puede bañarse como lo hace normalmente.



P: ¿Qué hago si me da comezón o aparecen ampollas en el brazo?

R: Ponga un cubito de hielo en una toallita o en un pañuelo y póngaselo en el brazo. ¡NO SE RASQUE!

P: ¿Puedo usar un “curita” si hay sangrado?

A: NO. Los “curitas” aumentan las alergias. Use un trocito de algodón seco para limpiar la sangre.



**Deberá regresar a esta clínica en un plazo de 48 a 72 horas para la lectura de la prueba o será necesario repetirla.**