

Bệnh Lao & HIV có liên quan với nhau như thế nào?

Những người bị HIV có rất dễ mắc bệnh Lao không?

Có. Những người bị nhiễm HIV (siêu vi trùng gây bệnh AIDS) dễ bị nhiễm trùng một số bệnh hơn, ví dụ như bệnh Lao. HIV làm suy yếu hệ miễn dịch của người bị nhiễm cho đến khi không còn có thể chống lại một số bệnh nhiễm trùng nữa.

Người bị HIV nên làm xét nghiệm Lao qua da trong thời gian chăm sóc sức khỏe bình thường vì đây là xét nghiệm duy nhất có thể phát hiện nhiễm Lao ở giai đoạn đầu trong cơ thể. Có thể cần những xét nghiệm khác để chắc chắn là quý vị không mắc bệnh Lao ở những giai đoạn sau.

Người bị HIV và nhiễm Lao có thể làm gì để phòng bệnh Lao?

Người bị HIV và nhiễm Lao có thể uống thuốc để giảm nguy cơ mắc bệnh Lao. Bất kỳ người nào bị HIV tiếp xúc với người khác bị bệnh Lao nên được người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám.

Còn điều gì khác mà tôi nên biết về bệnh Lao và HIV?

Người ta người dễ nhiễm Lao hơn nếu họ sống hoặc tới thăm các nước có tỷ lệ người bị bệnh Lao cao (châu Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh, Đông Âu, Nga), làm việc hoặc sống với những người vô gia cư hoặc những người được đưa vào sống trong nhà tế bần, tiêm ma túy trên đường phố hoặc nghiện rượu, nếu họ ở gần người mắc bệnh Lao, hoặc mắc những bệnh làm suy yếu hệ miễn dịch. Đồng thời, xét nghiệm Lao qua da có thể là âm tính ở những người bị HIV mặc dù họ bị bệnh Lao vì hệ miễn dịch bị suy yếu.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có nguy cơ mắc HIV và bệnh Lao, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị hoặc với Chương Trình Phòng Chống Lao của Sở Y Tế và Nhân Dụng tại số (619) 692-5565.

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp Y Tế (Medi-Cal).

Những người bị nhiễm Lao hoặc bị bệnh Lao cũng có thể đủ tiêu chuẩn nhận TB-Cal. Để tìm hiểu về tiêu chuẩn đủ điều kiện của quý vị và yêu cầu có đơn xin và bộ hồ sơ thông tin, xin vui lòng gọi số 1-858-514-6885. Có nhận những cuộc điện đàm do người được gọi trả tiền. (Collect calls)